Figure S2 Effect of high versus low Hb targets on stroke in patients with CKD.

Study or Subgroup	High Hb target Events	Total	Low Hb target Events	Total	Weight	Risk Ratio M-H, Fixed, 95% CI
2.1.1 High Hb target (about 13g/dl) versus Low Hb group (about 10g/dl)						
Besarab 1998	14	618	9	615	12.1%	1.55 [0.68, 3.55]
Singh 2006	12	715	12	717	16.1%	1.00 [0.45, 2.22]
Villar 2011	1	46	0	43	0.7%	2.81 [0.12, 67.14]
Subtotal (95% CI)		**1379**		**1375**	**29.0%**	**1.27 [0.73, 2.23]**
Total events	27		21			
Heterogeneity: Chi² = 0.80, df = 2 (P = 0.67); I² = 0%						
Test for overall effect: Z = 0.85 (P = 0.40)						
2.1.2 ESA treatment (about 12g/dl) versus no ESA treatment group (about 9g/dl)						
Pfeffer 2009	101	2012	53	2026	71.0%	1.92 [1.38, 2.66]
Subtotal (95% CI)		**2012**		**2026**	**71.0%**	**1.92 [1.38, 2.66]**
Total events	101		53			
Heterogeneity: Not applicable						
Test for overall effect: Z = 3.91 (P < 0.0001)						
Total (95% CI)		**3391**		**3401**	**100.0%**	**1.73 [1.31, 2.29]**
Total events	128		74			
Heterogeneity: Chi² = 2.36, df = 3 (P = 0.50); I² = 0%						
Test for overall effect: Z = 3.83 (P = 0.0001)						
Test for subgroup differences: Chi² = 1.53, df = 1 (P = 0.22), I² = 34.7%